

# IMPFKALENDER

Impfung	Alter											
	in Wochen	in Monaten				in Jahren						
		6	2	3	4	11 bis 14	15 bis 23	2 bis 4	5 bis 6	9 bis 14	15 bis 17	ab 18
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2			A (ggf. N) <sup>e</sup>
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2			A (ggf. N) <sup>e</sup>
Pertussis Keuchhusten		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2			A (ggf. N) <sup>e</sup>
Hib H influenzae Typ b		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N					
Poliomyelitis Kinderlähmung		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N		A1			ggf. N
Hepatitis B		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N					
Pneumokokken <sup>a</sup>		G1		G2	G3	N						S <sup>g</sup>
Rotaviren	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)									
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)			N				
Masern					G1	G2		N				S <sup>f</sup>
Mumps, Röteln					G1	G2		N				
Varizellen Windpocken					G1	G2		N				
Influenza Grippe												S jährlich
HPV Humane Papillomviren									G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>	

**G = Grundimmunisierung**

(in bis zu 4 Teilimpfungen G1 - G4)

**A = Auffrischimpfung**

**N = Nachholimpfung**

**S = Standardimpfung**

- a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Diese Dosis kann bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes entfallen.
- d Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen die mindestens 18 Jahre alt sind mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.